

Тактика поведения педагога при реальном столкновении с употреблением учащимися курительных смесей или других психоактивных веществ:

В случае, когда состояние учащегося может быть расценено как наркотическое опьянение, необходимо:

1. Удалить учащегося из группы, отделить его от одноклассников, до прибытия медицинского работника находиться рядом с учащимся.
2. Срочно вызвать медицинского работника УО. В случае отсутствия медицинского работника и при неадекватном поведении учащегося (см. признаки употребления) немедленно вызвать «Скорую помощь».
3. Немедленно поставить в известность администрацию колледжа.
4. Известить о случившемся родителей или опекунов.
5. Нецелесообразно немедленно проводить разбирательство о причинах и обстоятельствах употребления алкоголя или наркотиков. Собеседование с учащимся по этому случаю следует провести после встречи с родителями и медицинским работником, т.е. после получения объективной информации о возможностях и путях коррекционного вмешательства.
6. При совершении учащимся в наркотической интоксикации или алкогольном опьянении хулиганских действий, целесообразно прибегнуть к помощи правоохранительных органов.

Самым грозным осложнением употребления наркотиков и токсических средств является **передозировка**. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания, сердца или перекрытия рвотными массами дыхательных путей. Важно вовремя оказать первую помощь и **вызвать «Скорую помощь»**.

Признаками передозировки являются: потеря сознания, резкая бледность, неглубокое и редкое дыхание, плохо прощупывающийся пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители, рвота.

Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков:

- вызвать «Скорую помощь».
- повернуть на бок.
- очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.
- следить за характером дыхания до прибытия врачей.
- при частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту делать искусственное дыхание.

Внешние признаки употребления СПАЙСОВ:

Общие признаки употребления наркотических веществ: внешний вид и поведение в той или иной мере напоминает состояние алкогольного опьянения, но запах алкоголя изо рта отсутствует или слаб и не соответствует состоянию.

Изменение сознания: сужение, искажение, помрачение.

Изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость, болтливость, злобность, агрессивность, явно не соответствующие данной ситуации.

Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации).

Изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность (или размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), нарушение почерка.

Изменение цвета кожи: бледность лица и всей кожи или, наоборот, покраснение лица и верхней части туловища.

Изменения в глазах: блеск, сильно суженные или сильно расширенные зрачки, не реагирующие на свет, покрасневшие белки глаз.

Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса.

Изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность или же замедленность, невнятность, нечеткость речи.

Воздействие спайсов:

В отличие от растительных препаратов, например, конопли, действие курительных смесей на человеческий организм в 5-10 раз сильнее. Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна многоэтажного дома. Уже зарегистрированы случаи со смертельным исходом.